



SPAY / NEUTER

POST-OPERATIVE INSTRUCTIONS

For your dog's safety, please read and follow these instructions.

- Keep your pet confined to a warm, quiet environment and separate from other pets and young children for the first 12 hours.
- No running, jumping, playing, rough housing, or strenuous activity for 7 to 10 days following surgery.
- Pets should stay indoors and be kept quiet. Walk dogs on a leash.
- Keep your pet dry for 7 to 10 days following surgery. No baths, swimming or rolling in wet grass. The top layer of the surgical incision is closed with surgical glue and will come open if the area gets wet.
- Check the incision twice a day. What you see at the time you pick your animal up from surgery is normal; there should be no discharge and minimal redness or swelling.
- Male dogs may appear as if they still have testicles. This is normal. The swelling will gradually decrease during the next few days.
- DO NOT let your animal lick the incision area. If this occurs, you will need to buy an Elizabethan collar (plastic lampshade collar) at your vet or at a pet supply store. If this instruction is not followed, the incision can be licked open and will become infected.
- Unless you are told otherwise, your pet does not have external sutures. All sutures are absorbable on the inside and the very outer layer of skin is held together with surgical glue. As the wound heals, there may be a firm lump under the incision as the absorbable sutures break down.
- Do not clean or apply topical ointment to the incision site. This can cause the incision to open.
- Please note that your pet did receive a small, green tattoo. The purpose of the tattoo is to identify your pet as altered should your pet ever get lost/impounded at the shelter, there would be no attempt to spay/neuter again.
- You may provide a small amount of food and water to your adult pet tonight, but he or she may not have a full appetite until tomorrow.



SPAY / NEUTER

POST-OPERATIVE INSTRUCTIONS

- You should provide normal amounts of food and water this evening for any puppy less than 6 months of age.
- Do not change your pet's diet or give table scraps as this can mask post-operative complications.
- Give only prescribed medications. Do not give Tylenol, aspirin or other human pain relievers, as they can be deadly to your pets. Your pet received pain medicine at the time of surgery.
- Some animals appear to feel 100% right away, while others recover more slowly.
- Dogs may have a slight cough for a few days.
- If your pet was in heat she must be kept away from males for at least 14 days following surgery. If a male tries to mate with her, serious bleeding and trauma to your pet's reproductive tract may occur, possibly leading to death.
- We recommend that your animal receive a post-operative examination with your regular veterinarian 7-10 days after surgery. Please have the incision checked for complete healing and discuss additional needs, follow-up care, and booster vaccines.

Surgical Complications

Spaying and neutering are relatively safe surgeries, however complications can occur. Signs to look out for are as follows

- pale gums
- depression
- vomiting
- diarrhea
- discharge or bleeding from the incision
- excessive swelling from the incision site
- difficulty urinating
- labored breathing

If you have any concerns, please take your pet to your primary veterinarian to address any post-operative complications, diseases, illnesses, or injuries. We cannot be held responsible for post-operative complications resulting from the surgery, from a contagious disease for which the animal was not previously properly vaccinated, or from underlying health issues not known at the time of surgery. We will not cover those costs.



ESTERILIZACIÓN

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS

Para la seguridad de su perro, lea y siga estas instrucciones.

- Mantenga a su mascota confinada en un ambiente cálido y tranquilo y separada de otras mascotas y de niños pequeños durante las primeras 12 horas.
- No correr, saltar, jugar, vivir en condiciones difíciles ni realizar actividades extenuantes durante 7 a 10 días después de la cirugía.
- Las mascotas deben permanecer en el interior y mantenerse en silencio. Pasear perros con correa.
- Mantenga a su mascota seca durante 7 a 10 días después de la cirugía. No bañarse, nadar o revolcarse en la hierba mojada. La capa superior de la incisión quirúrgica se cierra con pegamento quirúrgico y se abrirá si el área se moja.
- Revise la incisión dos veces al día. Lo que ve en el momento en que recoge a su animal de la cirugía es normal; no debe haber secreción y un enrojecimiento o hinchazón mínimos.
- Los perros machos pueden parecer como si todavía tuvieran testículos. Esto es normal. La hinchazón irá disminuyendo gradualmente durante los próximos días.
- NO permita que su animal lama el área de la incisión. Si esto ocurre, necesitarás comprar un collar isabelino (collar de plástico con pantalla de lámpara) en tu veterinario o en una tienda de artículos para mascotas. Si no se siguen estas instrucciones, la incisión se puede abrir con lamido y se infectará.
- A menos que le indiquen lo contrario, su mascota no tiene suturas externas. Todas las suturas son absorbibles por dentro y la capa exterior de piel se mantiene unida con pegamento quirúrgico. A medida que la herida sana, es posible que quede un bullo firme debajo de la incisión a medida que las suturas absorbibles se rompen.
- No limpie ni aplique ungüento tópico en el sitio de la incisión. Esto puede hacer que la incisión se abra.
- Tenga en cuenta que su mascota recibió un pequeño tatuaje verde. El propósito del tatuaje es identificar a su mascota como alterada. Si alguna vez se pierde o es confinada en el refugio, no habrá ningún intento de esterilizarla o castrarla nuevamente.
- Puede proporcionarle una pequeña cantidad de comida y agua a su mascota adulta esta noche, pero es posible que no tenga pleno apetito hasta mañana.



ESTERILIZACIÓN

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS

- Esta noche debes proporcionar cantidades normales de comida y agua a cualquier cachorro de menos de 6 meses de edad.
- No cambie la dieta de su mascota ni le dé sobras de la mesa, ya que esto puede enmascarar complicaciones postoperatorias.
- Administre únicamente medicamentos recetados. No le dé Tylenol, aspirina u otros analgésicos para humanos, ya que pueden ser mortales para sus mascotas. Su mascota recibió analgésicos en el momento de la cirugía.
- Algunos animales parecen sentirse al 100% de inmediato, mientras que otros se recuperan más lentamente.
- Los perros pueden presentar una ligera tos durante unos días.
- Si su mascota estuvo en celo debe mantenerse alejada de los machos durante al menos 14 días después de la cirugía. Si un macho intenta aparearse con ella, pueden producirse hemorragias graves y traumatismos en el tracto reproductivo de su mascota, que posiblemente provoquen la muerte.
- Recomendamos que su animal reciba un examen postoperatorio con su veterinario habitual entre 7 y 10 días después de la cirugía. Haga que revisen la incisión para verificar que haya cicatrizado por completo y analice las necesidades adicionales, la atención de seguimiento y las vacunas de refuerzo.

Complicaciones quirúrgicas

La esterilización y castración son cirugías relativamente seguras, sin embargo, pueden ocurrir complicaciones. Las señales a tener en cuenta son las siguientes

- encías pálidas
- depresión
- vómitos
- diarrea
- secreción o sangrado de la incisión
- hinchazón excesiva del sitio de la incisión
- dificultad para orinar
- dificultad para respirar

Si tiene alguna inquietud, lleve a su mascota a su veterinario de cabecera para abordar cualquier complicación, enfermedad o lesión posoperatoria. No nos hacemos responsables de las complicaciones postoperatorias que resulten de la cirugía, de una enfermedad contagiosa para la cual el animal no haya sido vacunado adecuadamente o de problemas de salud subyacentes desconocidos en el momento de la cirugía. No cubriremos esos costos.